

TABELA 1 – Drogas vasoativas, antiarrítmicas, anti-hipertensivas e inotrópicas (continuação)

Princípio ativo	Nome comercial	Apresentação	Posologia	Ação	Efeitos colaterais/metabolismo
Losartan potássico	Cozaar®	50 mg cp	(VO) 50 mg/dia	Bloqueador de receptores AT1 da angiotensina II, no músculo liso vascular e na córtex adrenal	<ul style="list-style-type: none"> - Hipotensão - Tontura - Cefaléia - Hiperpotassemia - Diarréia - Dispepsia - Insônia - Hepatotoxicidade Metabolismo: H, P
Metildopa	Aldomet®	250 e 500 mg cp	(VO) 500 mg a 2 g/dia (dividida em 2-4x)	Agonista adrenérgico alfa-2 de ação central	<ul style="list-style-type: none"> - Sedação - Boca seca - Hipotensão - Tontura - Depressão - Disfunção erétil - Bradicardia - Náusea - Cefaléia - Edema periférico - Anemia hemolítica - Hepatotoxicidade Metabolismo: P, LM, D
Metoprolol	Seloken®	100 mg cp	(VO) 100 a 400 mg/dia (dividida em 1-4x)	Bloqueador adrenérgico beta-1 seletivo	<ul style="list-style-type: none"> - Bradicardia - Hipotensão - Broncoespasmo em pacientes com antecedentes - Cansaço - Distúrbio de sono - Disfunção erétil - Depressão - Ajustar dose para insuficiência renal Metabolismo: H, D
Milrinona	Primacor IV®	1 mg/ ml fap 20 ml	(EV) ataque: 50 mcg/kg em 10 min manutenção: 0,25-1 mcg/kg/min diluir: 1 fap em 180 ml de SG 5% conc 100 mcg/ml	Inibidor da fosfodiesterase na célula miocárdica, ↑ AMPc intracelular e da contratilidade; vasodilatador potente de ação direta nas células musculares lisas vasculares	<ul style="list-style-type: none"> - Arritmia ventricular - Hipotensão - Plaquetopenia (mais rara que com amrinona) - Ajustar dose para insuficiência renal e hepática T ½ 2,3h Metabolismo: H
Minoxidil*	Loniten®	10 mg cp	(VO) 5-20 mg (2-4/dia)	Vasodilatador direto de ação no músculo liso vascular arterial	<ul style="list-style-type: none"> - Taquicardia reflexa significativa - Retenção de Na e água - Edema - Hipertricose - Ginecomastia - Cefaléia Metabolismo: H, P, LM
Nadolol	Corgard®	40 e 80 mg cp	(VO) 40-160 mg/dia em 1 dose	Bloqueador beta-adrenérgico não-seletivo	<ul style="list-style-type: none"> - Bradicardia - Hipotensão - Broncoespasmo em pacientes com antecedentes - Cansaço - Distúrbio de sono - Disfunção erétil - Depressão - Ajustar dose para insuficiência renal Metabolismo: D