

TABELA 2 – Anticoagulantes, trombolíticos, antiagregantes plaquetários e inibidores de glicoproteína IIb/IIIa (continuação)

Nome químico	Nome comercial	Apresentação	Dose	Ação	Efeitos colaterais/ metabolismo
Tirofiban	Agrastat®	0,25 mg/ml fr 50 ml 0,05 mg/ml bolsa 250 ml	(EV) inicial: 0,4 mcg/kg/min por 30 min manutenção: 0,1 mcg/kg/min por até 96h	Antagonista não-peptídico, que se liga reversivelmente à glicoproteína IIb/IIIa da superfície plaquetária, inibindo sua agregação	- Sangramento - Plaquetopenia T $\frac{1}{2}$ 1,9 a 2,2h
Warfarina sódica	Coumadin®	1; 2,5 e 5mg cp 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg e 10 mg cp 5 mg	(VO) inicial 10 mg/dia, manutenção: 2-10 mg/dia acertar pelo tempo de protrombina ou RNI	Anticoagulante cumarínico, antagonista de vitamina K, diminui a carboxilação de fatores II, VII, IX e X	- Sangramento - Necrose cutânea - Dermatite - Alopecia T $\frac{1}{2}$ 20-60h Metabolismo: H, P