

TABELA 5 – Classificação de insuficiência renal – RIFLE

	Critério de RFG	Critério de débito urinário (DU)
Risco (<i>risk</i>) de disjunção renal	Aumento da creatinina sérica x 1,5 ou decréscimo do RFG > 25%	DU < 0,5 ml/kg/h x 6h
Lesão (<i>injury</i>) renal	Aumento da creatinina sérica x 2 ou decréscimo do RFG > 50%	DU < 0,5 ml/kg/h x 12h
Falência (<i>failure</i>) da função renal	Aumento da creatinina sérica x 3 ou decréscimo do RFG 75% ou creatinina sérica \geq 4 mg/dl	DU < 0,3 ml/kg/h x 24h ou anúria x 12h oligúria
Perda (<i>loss</i>) da função renal	IRA persistente = perda completa da função renal > 4 semanas	
Doença renal de estágio final (ESKD)	Doença renal de estágio final/terminal (> 3 meses)	

RFG: ritmo de filtração glomerular; ESKD: *end-stage kidney disease*; IRA: insuficiência renal aguda; RIFLE-Fc: denota agudização de doença renal crônica; RIFLE-Fo: denota oligúria; a especificidade aumenta a partir da classificação de falência; risco e lesão: alta sensibilidade. ADQI Group, Critical Care, 2004.