

TABELA 11 – Principais propriedades dos sedativos e hipnoanalgésicos empregados em UTI

	Dose da sedação	Manutenção	Início da ação	Duração da ação	Efeitos colaterais
Diazepam	0,1-0,3 mg/kg		< 2 min	15 min a 1 h	Flebite
Midazolam	0,01-0,1 mg/kg	0,25-5 mcg/kg/min	< 30 s	15 a 80 min	Depressão respiratória
Flumazenil	4,20 mcg/kg	30-60 mcg/min até máximo de 3 mg/h	1 min	45 a 90 min	Taquicardia e hipertensão
Propofol	0,5-1 mg/kg	20-70 mcg/kg/min	40 s	5 a 10 min	Hipotensão
Etomidato	0,1-0,4 mg/kg	5-20 mcg/kg/mi	30 a 60 s	3 a 10 min	Mioclonia, supressão adrenal
Tiopental	1-4 mg/kg, redução PIC	0,05-0,35 mg/kg/min	10 a 20 s	5 a 15 min	Hipotensão
Morfina	0,05-0,2 mg/kg	0,5-10 mg/h	< 1 min	2 a 7 h	Depressão respiratória
Meperidina	0,5-2 mg/kg		< 1 min	2 a 4 h	Não associar com IMAO
Fentanil	0,7-2 mcg/kg	0,3-3 mcg/kg/h	30 s	30 a 60 min	Depressão respiratória, rigidez torácica
Alfentanil	0,15-0,2 mg/kg	0,05-1,25 mcg/kg/min	1 a 2 min	10 a 15 min	Depressão respiratória, rigidez torácica
Remifentanil	0,5-1 mcg/kg	0,025-0,1 mcg/kg/min	30 s	5 a 10 min	Depressão respiratória, rigidez torácica
Dexmedetomidina	1 mcg/kg em 10 min	0,2-0,7 mcg/kg/h		2 a 3 h	Hipo ou hipertensão