

**TABELA 7 – Índice de intervenção terapêutica - TISS**

<b>Procedimentos e pontuação</b>			
<b>4 pontos</b>	<b>3 pontos</b>	<b>2 pontos</b>	<b>1 ponto</b>
• Parada cardiorrespiratória ou cardioversão elétrica	• Nutrição parenteral por via de acesso venoso central	• Medida da pressão venosa central	• Monitorização eletrocardiográfica
• Ventilação controlada com ou sem PEEP	• Marcapasso cardíaco em demanda	• Utilização de dois cateteres venosos periféricos	• Balanço hídrico padrão (cada 24 h)
• Ventilação controlada com o uso de relaxantes musculares	• Drenagem torácica	• Hemodiálise em paciente estável	• Utilização de um cateter venoso
• Tamponamento de varizes esofágicas com balão	• Ventilação mandatória intermitente (IMV)	• Traqueostomia (fase inicial)	• Uso crônico de anticoagulante
• Infusão intra-arterial contínua	• Ventilação com pressão positiva contínua (CPAP)	• Ventilação espontânea via tubo endotraqueal	• Balanço hídrico padrão
• Cateter em artéria pulmonar	• Infusão concentrada de potássio via cateter venoso central	• Nutrição via sonda nasogástrica ou enteral	• Realização de exames laboratoriais
• Marcapasso atrial ou ventricular	• Intubação naso/orotraqueal	• Reposição de volume endovenoso	• Prescrição de medicação intermitente
• Hemodiálise em paciente instável	• Aspiração intratraqueal não dirigida	• Quimioterapia parenteral	• Troca rotineira de curativos
• Diálise peritoneal	• Balanço hídrico freqüente	• Controle horário de sinais neurológicos	• Tração ortopédica comum
• Hipotermia induzida	• Dosagens sanguíneas freqüentes	• Múltiplas trocas de curativos	• Cuidados com traqueostomia
• Infusão de sangue sob pressão	• Infusão freqüente de derivados de sangue (mais de 5U/24h)	• Infusão de pitressina	• Medidas terapêuticas para úlcera de decúbito
• G-suit	• Infusão de medicação em <i>bolus</i>		• Uso de sonda vesical
• Monitorização da pressão intracraniana	• Infusão de droga vasoativa (uma droga)		• Uso de cateter ou máscara de O <sub>2</sub>
• Transfusão de plaquetas	• Infusão contínua de antiarrítmicos		• Uso de antibióticos (dois ou menos)
• Utilização de balão intra-aórtico	• Cardioversão por arritmia		• Fisioterapia respiratória
• Procedimentos cirúrgicos de urgência	• Colchão térmico		• Irrigação abdominal, debridamento de feridas, colostomia
• Lavagem de sangramento gastrintestinal agudo	• Cateter arterial		• Sonda nasogástrica aberta
• Endoscopia ou broncoscopia de urgência	• Uso de digital (fase inicial)		• Nutrição parenteral periférica
• Infusão de droga vasoativa (mais de uma droga)	• Medida do débito cardíaco		
	• Uso de diuréticos		
	• Prescrição para alcalose metabólica		
	• Prescrição para acidose metabólica		
	• Toracocentese, paracentese, pericardiocentese de urgência		
	• Anticoagulação (fase inicial)		
	• Sangria		
	• Uso de antibióticos (mais de dois)		
	• Medicação para convulsões ou encefalopatia metabólica		
	• Tração ortopédica complexa		